Passo a passo da coleta de sangue em FTA



Para a execução de um teste confiável e de qualidade, a fase pré-analítica (coleta do material biológico) é uma das etapas mais críticas do processo. Uma coleta adequada permite que os exames sejam realizados com mais precisão, já que os perfis genéticos ficam mais bem definidos.

O DB utiliza o papel-filtro para a coleta das amostras dos periciandos, devido à facilidade de coleta, transporte, estocagem e processamento.

Mas para que todas essas vantagens sejam alcançadas, algumas dicas importantes devem ser seguidas:



Não fazer a coleta da amostra em tubo com anticoagulante e transferir esse material para o papel-filtro.



Aguardar que o papel-filtro absorva o material depositado antes de colocá-lo dentro do kit de paternidade.

Verificar se o círculo do papel-filtro está completamente preenchido com a amostra, e que esta tenha transpassado para o seu verso.

Correto ✔



Errado ✖

Sangue na borda no verso do cartão



Errado ✖

Não passou para o verso



Passo a passo da coleta de saliva em FTA



1 A participante deve evitar ingestão de alimentos e bebidas de 30 a 60 minutos antes da coleta.



2 Ela deve realizar bochecho com água, anteriormente à coleta.

3 A participante deve cuspir uma quantidade de saliva suficiente para encharcar o papel-filtro.

4 Verifique se a saliva atravessou o papel-filtro.



5 Aguarde a secagem completa do cartão (aproximadamente 15 min).

Observação: Para participantes submetidos à **transfusão de sangue nos últimos 6 meses** e/ou **transplante de medula**, o material a ser coletado deverá ser obrigatoriamente **saliva** ou **swab oral**.

Passo a passo da coleta de swab oral

1 O participante deve evitar a ingestão de alimentos e bebidas de 30 a 60 minutos antes da coleta.



2 Ele deve realizar bochecho com água, anteriormente à coleta.

3 Com uma escovinha coletora (preferencialmente *swab rayon*), friccione a mucosa, girando a escovinha, no mínimo, 5 vezes em cada lado da bochecha.



4 Armazene a escovinha coletora no tubo de transporte.

5 Repita o procedimento com o segundo *swab*.

6 Envie cada *swab* separadamente em um tubo de transporte seco, ambos em temperatura ambiente.

Observação: Para participantes submetidos à **transfusão de sangue nos últimos 6 meses** e/ou **transplante de medula**, o material a ser coletado deverá ser obrigatoriamente ***Saliva*** ou ***Swab Oral.***